


帰国後2週間程度は

麻疹 発症の可能性を考慮し 健康状態に注意してください。




麻疹報告数上位10の国々

国名	報告数
イエメン	11,288
インドネシア	10,744
インド	9,666
パキスタン	7,361
アンゴラ	4,843
ラオス人民民主共和国	3,167
メキシコ	2,846
ナイジェリア	2,755
アフガニスタン	2,668
モンゴル	2,551

麻疹報告数



日本国内で届出された麻疹症例の推定感染地域



- インドネシア (10例)
- シンガポール (1例)
- インドネシア/シンガポール (1例)
- フィンランド/イタリア/フランス (1例)
- フィリピン (1例)
- 大韓民国 (1例)

WHO(世界保健機関) 麻疹報告数 (2025年7月~2025年12月)

2026年第1週~第9週 (令和7年12月29日~令和8年3月4日)

令和8年2月現在 ; 一部改変

<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/monitoring/provisional-monthly-measles-and-rubella-data>

帰国後2週間程度は

☒ **高熱や全身の発しん、せき、鼻水、目の充血などの症状に注意しましょう**

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください



厚生労働省

